

Uštknutí zmijí obecnou



Modelová situace

Otec jde lesem na horský výlet se svými dvěma syny (3 a 6 let). Na cestě vidí hada, který je stočený do klubička a nereaguje na kroky. Otec ho vyfotografuje, pak ho uchopí za hlavou a ukazuje chlapcům. Poté hada položí zpátky na zem a pokračují v cestě. Mladší z chlapců se rozběhne zpátky, protože má strach, aby hada něco nepřejelo. Chytí ho do ruky a on ho uštkne. Nastala panika a otec se snažil rychle dostat do nejbližší nemocnice, kde je lékařka ujistila, že se jedná o uštknutí zmijí. Dítě bylo nutné hospitalizovat na dětské jednotce intenzivní péče v oblastní nemocnici, kam byl otec odeslán vlastním autem, navigaci neměl a příslušné město s oblastní nemocnicí neznal (cca 20 km). Postižené dítě v autě plakalo, horní končetina rychle otékala a bolela a byly zřejmé i známky celkové otravy (zvracení, průjem..). Posléze hysterický otec oblastní nemocnici našel, dítě bylo ošetřeno a hospitalizováno. Po pěti dnech byl chlapec propuštěn do domácího ošetřování.

Definice:

- dvě bodné ranky vedle sebe, kterými se do těla postiženého dostane hadí jed,
- toxiny zmije obecně jsou svým složením velmi nepříznivé, naštěstí maximální množství při uštknutí jsou asi 2/3 smrtelné dávky pro dospělého člověka

Příznaky:

- dvě drobné ranky, jejich okolí je zarudlé,
- u oslabeného jedince nebo u dětí může mít dramatický průběh,
- do 30 minut po uštknutí se objeví otok v místě poranění, bolestivost a následné zduření mizních uzlin (maximum do 48 hod po uštknutí),
- během 60 minut může být bolest břicha, průjem, zvracení a arteriální hypertenze

Těžší postižení:

- generalizovaný otok s maximem v oblasti rtů, jazyka a tváře,
- pozor na anafylaxi!
- nejnebezpečnější projev otravy – vazomotorický kolaps s poklesem TK, poruchou vědomí, studeným potem a cyanózou,
- v nejzávažnějších případech dochází až k rozvoji šoku s bezvědomím,
- uzdravení trvá 1 – 3 týdny, po dobu několika měsíců mohou přetrvávat bolestivost a otoky

První pomoc

- volat RLP,
- zklidnit postiženého,
- přiložit škrtidlo 10 cm nad ránu (mezi ránu a srdce), škrtidlo má být volné, abychom pod něj prostrčili prst,
- imobilizovat končetinu (většinou se jedná o končetinu),
- ránu dezinfikovat a překrýt,
- sledovat fyziologické funkce,
- transportovat vleže,
- **místo uštknutí se NEPROŘEZÁVÁ, NEVYSÁVÁ, NEVYPALUJE !!!**