

Alergie na léky

Otázky a úkoly pro mladšího žáka:

1. Napiš, co udělala matka nesprávně:

- Matka neměla po podání léku od dítěte odcházet.
- Dítě by nemělo být v době nemoci samotné, rozhodně půl hodiny po podání léku musí být sledováno.

2. Co uděláš, když budeš mít po požití léku vyrážku, svědění kůže nebo nepříjemné pálení očí a slzení?

- Označ správné odpovědi:
- Řeknu si, že mě to za chvíli přejde.
- **Ihned to ukážu rodičům.**
- Vezmu si další prášek, protože antibiotika se musí užívat pravidelně.
- Antibiotika už jsem bral, vyrážka nevádí.

3. Jak má rodič správně postupovat, když dítě bere antibiotika?

Označ správné odpovědi:

- Dá dítěti zapít prášek vhodnou tekutinou, např. vodou, čajem (ne mlékem).
- Desetileté dítě už je dost velké, může si lék vzít samostatně.
- **Rodič dá dítěti lék zapít vhodnou tekutinou, nejméně půl hodiny se od dítěte nevzdaluje a sleduje, zda dítě nemá žádné alergické projevy.**
- Rodič dítě poučí, jak má lék užívat, a kontroluje, zda nemá nějaké alergické projevy.

Otázky a úkoly pro staršího žáka:

1. Napiš, jak se měl chlapec nebo jeho matka zachovat?

- Počkat, až přijde matka domů ze zaměstnání.
- Zatelefonovat matce a říci jí o svých problémech, ta bude chlapcovy problémy konzultovat s ošetřujícím lékařem a dále postupovat dle jeho instrukcí.
- Matka rozhodne, že si chlapec vezme ještě další dávku antibiotik a uvidí se, jestli se stav zhorší.
- Chlapec si řekne, že to přejde. Proč by měl alergii na antibiotika, když už je dříve užíval?

2. Která z následujících tvrzení jsou pravdivá?

- Léky jsou k tomu, aby léčily, nemohou mi nijak uškodit.
- Na každý lék může být alergická reakce.
- Alergická reakce nemusí být pouze kopřivka, pálení očí nebo rýma, ale může se projevit zhoršeným dýcháním, které se stupňuje. Může skončit i smrtí.
- Léky můžu brát samostatně jen po důkladné instrukci od rodiče.
- Když mě bude bolet v krku, matka mi dá antibiotika, která zbyla po minulé nemoci. Aspoň nemusím čekat v čekárně u lékaře.